第2類医薬品 **八味地黄丸 / 1袋：900粒(30日分)**

【用法・用量】 次の量を食前または食間に水またはお湯と一緒に服用してください。
（食間とは食後2~3時間を指します）

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	10粒	3回
15歳未満	服用しないこと	

用法及び用量に関する注意
用法及び用量を厳守してください。

【効果・効能】
体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿でときに口渇があるものの次の諸症：下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善（肩こり、頭重、耳鳴り）、軽い尿漏れ

【成分及び分量】 本剤1日量30粒中に、次の生薬が含まれています。

地黄(ジオウ)末 ・・・1,026mg　茯苓（ブクリョウ)末 ・・・513mg
山茱萸(サンシュユ) 末 ・・・513mg　牡丹皮(ボタンピ)末 ・・・513mg
山薬（サンヤク）末 ・・・513mg　桂皮（ケイヒ）末 ・・・171mg
沢瀉(タクシャ)末 ・・・513mg　加工ブシ(カコウブシ) 末 ・・・85mg

添加物としてハチミツを含有しています。

【保管及び取り扱い上の注意】
(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。 (2)小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）(4) 本品は丸剤で、水分が丸剤につくと、表面のハチミツが一部とけて、変色又は色むらを 生じることがありますので、ぬれた手で取り扱ったり、冷蔵庫などから出してすぐにあけたりしないでください。
●本剤は天然の生薬を原料として製造していますので、製品の色や味等に多少の差異が生じることがあります。効果には変わりありません。

⚠使用上の注意

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の人は服用しないこと　(1) 胃腸の弱い人。　(2) 下痢しやすい人。

相談すること
1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
(4)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
その他	動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ

(2)1ヶ月服用しても症状がよくならない場合
3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合 には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

下痢