

内服ボラギノール®PRO

第2類医薬品 痔疾用内服薬

外箱が開いていたり、中の包装が破れている等、
開封された形跡がある場合は使用しないでください

効能・効果: 次の場合の症状の緩和:痔核(いぼ痔)、きれ痔、痔出血
用法・用量: 次の量を服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	3回
15歳未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

本剤は水又はぬるま湯で服用してください。

成分: (1包1.5g中)

メリロートエキス 25mg
乙字湯エキス 283.3mg
トコフェロール酢酸エステル 33.3mg

添加物: タルフ、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、D-マンニトール、クロスカルメロースNa、ステアリン酸Mg、セルロース、白糖、無水ケイ酸

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)

授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4)次の症状のある人。下痢

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、吐き気・嘔吐、腹痛、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
便秘、下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなり、ない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがある。出血が長く続く場合は、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱い上の注意 (1)直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2)小児の手のとどかない所に保管すること。(3)他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)使用期限を過ぎた製品は、服用しないこと。

この箱は本剤とともに保管し、
服用の際によくお読みください。